

### تقویم تغذیه بادام زمینی کیاسم (۱۴۰۳)

مرحله رشد	کود پیشنهادی	کود جایگزین	نحوه مصرف	میزان مصرف	توضیحات
آماده سازی زمین	کود حیوانی		مصرف خاکی	کود حیوانی : ۱۰ تا ۱۵ تن در هکتار	
	گرانول میکرو ۵-۲-۵			گرانول میکرو ۵-۲-۵ : ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلو در هکتار	
ابتدای سبز شدن	سیترال هیو		آبیاری	سیترال هیو : ۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار	
	سیترال ۲۰-۲۰-۲۰		آبیاری	سیترال ۲۰-۲۰-۲۰ : ۴۰ تا ۵۰ کیلو در هکتار	
رشد رویشی			محلولپاشی		
شروع گلدهی	نیترات کلسیم سیترال		آبیاری	نیترات کلسیم سیترال : ۴۰ تا ۵۰ کیلو در هکتار	
شروع پایکدهی	کیامیکس		آبیاری	کیامیکس : ۲۵ کیلو در هکتار	
	سیترال ۲۰-۲۰-۲۰ + صابون محلولپاشی + بوفران		محلولپاشی	سیترال ۲۰-۲۰-۲۰ : ۲ کیلو در هکتار صابون محلولپاشی : ۱ لیتر در هزار لیتر آب بوفران : ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب	
رسیدگی دانه	سیترال ۱۵-۵-۳۰	سیترال ۱۲-۱۲-۳۶	آبیاری	سیترال ۱۵-۵-۳۰ : ۲۰ کیلو در هکتار سیترال ۱۲-۱۲-۳۶ : ۲۰ کیلو در هکتار	

- ❖ اولویت اول کوددهی، موارد مشخص شده با رنگ سبز می باشد.
- ❖ جهت تحقق بهترین نتایج، از این جدول تحت نظر کارشناسان مربوطه استفاده نمایید.
- ❖ در صورت نیاز به اختلاط با سموم یا کودهای خارج از جدول، ابتدا در سطح محدود روی گیاه مورد نظر آزمایش نمایید.
- ❖ مقادیر توصیه شده عمومی است و میزان مصرف، بسته به سن گیاه، شرایط محیطی و آزمایشات خاک و برگ متغیر است.