



راهنمای استفاده از سموم

گندم

(بیماری‌ها، آفات، علف‌های هرز)

نحوه و زمان مصرف	سم پیشنهادی	نام بیماری
ضد عفونی بذر قبل از کاشت	دیفنوكونازول FS3% + اكسيد مس WG75% {ديويدند(۱ ميلي ليتر + ۱ گرم در كيلوگرم بذر)}	لكه نواری باكتريایی
ضد عفونی بذر قبل از کاشت	كاربوکسين تيرام WP75% {ويتاواکس تيرام(۲ گرم در كيلوگرم بذر)}	پوسیدگی طوقه و ریشه گندم
سم پاشی به محض مشاهده علائم بیماری	پروپيکونازول EC25% {تيلت ۱-۰/۵ ليتر در هكتار}	سفیدک سطحی گندم و جو
	پيراكلواستروبین + فلوکسا پيروکساد EC22.5% {پرياکسور(۱/۵ ليتر در هكتار)}	
ضد عفونی بذر قبل از کاشت	تبوكونازول DS2% {راکسيل(۱/۵ گرم در كيلوگرم بذر)}	سیاهک آشکار گندم و جو
	ترياديمينول DS7.5% {بايتان(۲ گرم در كيلوگرم بذر)}	
	كاربوکسين تيرام FS40% {ويتاواکس تيرام(۲-۲/۵ ميليليتر در كيلوگرم بذر)}	
	دیفنوكونازول FS3% {ديويدند(۲ ميلي ليتر در كيلوگرم بذر)}	
ضد عفونی بذر قبل از کاشت	تری تیکونازول FS20% {رئال(۰/۲ گرم در كيلوگرم بذر)}	سیاهک پنهان گندم
	دی نیکونازول FS2% {سومی ایت(۲ گرم در كيلوگرم بذر)}	
سم پاشی در مرحله گلدهی	اپوکسی کونازول + تیوفانات متیل SC49.7% {رکس دو(۰/۵ ليتر در هكتار)}	فوزاریوم سنبله گندم
	فناماکریل SC25% {لیانگدی(۳ ليتر در هكتار)}	

نحوه و زمان مصرف	سم پیشنهادی	نام آفت
با نظر کارشناس، موثر روی سن مادر و پوره سن ۲	دلتامترین EC10% {دسیس (۴۵ میلی لیتر در هکتار)}	سن‌های غلات
	فنیتروتیون EC50% {سومیتیون (۱ لیتر در هکتار)}	
	فنتیون EC50% {لباسید (۱ لیتر در هکتار)}	
با نظر کارشناس و با مشاهده علائم خسارت	دیازینون G5% {گرانول (۳۰-۴۰ کیلوگرم در هکتار)}	سوسک سیاه گندم
	کلرپیروفوس EC40.8% {دورسبان (۲-۱/۵ لیتر در هکتار)}	
بیش از ۵ شته در هر بوته، در مرحله رویشی ۲ برگی	اسفن‌والریت EC2.5% {پرسانا (۰/۵ لیتر در هکتار)}	شته‌ها
	پیریمیکارب WP50% {پریمور (۱-۰/۵ کیلوگرم در هکتار)}	
پوره سن ۲-۳	فنیتروتیون ULV96% {سومیتیون (۰/۵ لیتر در هکتار)}	ملخ
	مالاتیون EC57% {مالاتیون (۱-۱/۵ لیتر در هکتار)}	
-	پودر سلیس P80% {دتیا دی ای (۱/۵ گرم در کیلوگرم)}	شپشه انباری
در صورت آلودگی شدید در مرحله ۳-۴ برگی	دیازینون EC60% {بازودین (۲ لیتر در هکتار)}	پروانه برگ خوار (مینوز)

زمان مصرف	علف کش پیشنهادی	علف هرز
۳ برگی تا ساقه دهی گندم	{سافیکس بی دابلیو(۴ لیتر در هکتار)}	باریک برگ
از اول تا پایان پنجه زنی	{ایلوکسان(۲/۵ لیتر در هکتار)} {پوماسیر(۱-۰/۸ لیتر در هکتار)} فنوکساپروپ پی اتیل + مفن پایردی اتیل EW75% {پوماسیر(۱-۰/۸ لیتر در هکتار)}	
ابتدا تا انتهای پنجه زنی	{برومایسیدام EC40% استر هگزیل اتیل + آ + اتیل هگزیل استر EC40% {برومایسیدام آ(۱/۵ لیتر در هکتار)}	پهن برگ
پنجه زنی تا تشکیل ساقه گندم	{توفوردی + ام سی پ آ SL67.5% {یو ۴۶ کمی فلوید(۱-۱/۵ لیتر در هکتار)}	
۲ تا ۴ برگی علف های هرز	{کاوین فلورکس(۲/۵ لیتر در هکتار)} EC20%	