



راهنمای استفاده از سموم

کلزا

بیماری‌ها، آفات، علف‌های هرز

نام بیماری	سم پیشنهادی	زمان مصرف
اسکلروتینیا	تبوکونازول EW25% {فولیکور(۱ لیتر در هکتار)}	با نظر کارشناس در مناطق آلوده
	سایپروکونازول+کاربندازیم SC42% {آلتوکمبی(۱ لیتر در هکتار)}	

نام آفت	سم پیشنهادی	زمان مصرف
بید کلم	ایندوکساکارب SC15% {آوانت(۰/۲۵ لیتر در هکتار)}	موثر روی لارو سنین اولیه
	هگزافلومورون EC10% {کنسالت(۰/۶ لیتر در هکتار)}	
زنبور برگخوار آتالیا	فوزالن EC35% {زولن(۲-۳ لیتر در هکتار)}	از مرحله کوتیلدونی تا ۴ برگی
	دیازینون EC60% {بازودین(۲ میلی- لیتر در لیتر)}	
سوسک گرده خوار	فوزالن EC35% {زولن(۲-۳ لیتر در هکتار)}	در مرحله غنچه دهی
	تیاکلوپرید OD24% {بیسکایا(۰/۳ لیتر در هکتار)}	

زمان مصرف	سم پیشنهادی	علف‌های هرز
۲ برگی تا قبل از ساقه رفتن علف- های هرز	سیکلوکسیدیم EC10% {فوکوس (۲ لیتر در هکتار)}	باریک برگ
۳ برگی تا قبل از ساقه رفتن علف- های هرز	کوئیزالوفوب - پی-تفوریل EC4% {(پنتر) (۱/۵ لیتر در هکتار)}	
قبل از کاشت و مخلوط با خاک	تری فلورالین EC48% {ترفلان (۲- ۲/۵ لیتر در هکتار)}	پهن برگ و باریک برگ
پس از رویش علف‌های هرز	کلوپیرالید SL30% {واچ (۸۰۰ میلی لیتر در هکتار)}	