

تقویم تغذیه گل محمدی کیاسم (۱۴۰۳)

مرحله رشد	کود پیشنهادی	کود جایگزین	نحوه مصرف	میزان مصرف	توضیحات
قبل از کاشت (آماده سازی زمین)	کود حیوانی + گوگرد بنتونیت دار		خاکی	کود حیوانی : ۲ تا ۳ تن در هکتار گوگرد بنتونیت دار : ۲۰۰ کیلو در هکتار	
	سیترال کیا ۱۰-۵-۱۰			سیترال کیا ۱۰-۵-۱۰ : ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلو در هکتار	
استارتر (شروع رشد)	سیترال هیو		آبیاری	۳۰ سیترال هیو : لیتر در هکتار	
	سیترال ۲۰-۲۰-۲۰		آبیاری	سیترال ۲۰-۲۰-۲۰ : ۴۰ تا ۵۰ کیلو در هکتار	
قبل از گلدهی	کیامیکس		آبیاری	کیامیکس : ۲۵ کیلو در هکتار	
	سیلیکانتو + صابون سیترال + بوفران		محلولپاشی	سیلیکانتو : ۲ لیتر در هکتار صابون سیترال : ۱ لیتر در هزار لیتر آب بوفران : ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب	
بعد از برداشت گل	سیترال ۲۰-۲۰-۲۰ + صابون سیترال + بوفران		محلولپاشی	سیترال ۲۰-۲۰-۲۰ : ۱ تا ۲ کیلو در هکتار صابون سیترال : ۱ لیتر در هزار لیتر آب بوفران : ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب	

- ❖ اولویت اول کوددهی، موارد مشخص شده با رنگ سبز می باشد.
- ❖ جهت تحقق بهترین نتایج، از این جدول تحت نظر کارشناسان مربوطه استفاده نمایید.
- ❖ در صورت نیاز به اختلاط با سموم یا کودهای خارج از جدول، ابتدا در سطح محدود روی گیاه مورد نظر آزمایش نمایید.
- ❖ مقادیر توصیه شده عمومی است و میزان مصرف، بسته به سن گیاه، شرایط محیطی و آزمایشات خاک و برگ متغیر است.