

تقویم تغذیه گوجه فرنگی فضای باز کیاسم (۱۴۰۳)

مرحله رشد	کود پیشنهادهی	کود جایگزین	نحوه مصرف	میزان مصرف	توضیحات
آماده سازی زمین	کود حیوانی (گاوی، گوسفندی، مرغی) + گرانول میکرو ۵-۲-۵		خاکی	کود حیوانی : ۲۰ تا ۳۰ تن در هکتار گرانول میکرو ۵-۲-۵ : ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلو در هکتار	
هفته دوم نشا تا هفته چهارم	اوره فسفات سیترا	سیترا ۱۰-۵۲-۱۰	آبیاری	اوره فسفات سیترا : ۲۵ کیلو در هکتار سیترا ۱۰-۵۲-۱۰ : ۲۰ تا ۳۰ کیلو در هکتار	
	سیترا هیو		آبیاری	سیترا هیو : ۲۰ تا ۳۰ لیتر در هکتار	
	سیترا ۲۰-۲۰-۲۰			سیترا ۲۰-۲۰-۲۰ : ۲۰ کیلو در هکتار	
پس از انتقال نشاء به بستر کاشت (هفته چهارم تا هفته ششم)	سیترا ۱۰-۵۲-۱۰	اوره فسفات سیترا	آبیاری	سیترا ۱۰-۵۲-۱۰ : ۴۰ تا ۵۰ کیلو در هکتار اوره فسفات سیترا : ۵۰ کیلو در هکتار	
	فروکا		خاکی	فروکا : ۳ تا ۵ کیلو در هکتار ؟	
	نیترا کلسیم سیترا		آبیاری	نیترا کلسیم سیترا : ۵۰ کیلو در هکتار	
	سیترا ۲۰-۲۰-۲۰ + صابون محلولپاشی + بوفران		محلولپاشی	سیترا ۲۰-۲۰-۲۰ : ۲۰ کیلو در هکتار صابون محلولپاشی : ۱ لیتر در هزار لیتر آب بوفران : ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب	
شروع تشکیل میوه	کافیک + صابون محلولپاشی + بوفران		محلولپاشی	کافیک : ۱ تا ۲ لیتر در هکتار صابون محلولپاشی : ۱ لیتر در هزار لیتر آب بوفران : ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب	
	سیترا ۲۰-۲۰-۲۰ + کیامیکس		آبیاری	سیترا ۲۰-۲۰-۲۰ : ۳۰ کیلو در هکتار کیامیکس : ۲۵ کیلو در هکتار	
	سیترا کلسیم بر + اکتیواتور + بوفران		محلولپاشی	سیترا کلسیم بر : ۱ تا ۲ لیتر در هکتار اکتیواتور : ۵/۰ لیتر در هزار لیتر آب بوفران : ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب	
	کافیتو + سیلیکانتو + صابون محلولپاشی + بوفران			کافیتو : ۲ لیتر در هکتار سیلیکانتو : ۲ لیتر در هکتار صابون محلولپاشی : ۱ لیتر در هزار لیتر آب بوفران : ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب	
فندق شدن میوه	نیترا کلسیم سیترا		آبیاری	نیترا کلسیم سیترا : ۲۰ تا ۳۰ کیلو در هکتار	
	سیترا ۱۲-۱۲-۳۶		آبیاری	سیترا ۱۲-۱۲-۳۶ : ۳۰ کیلو در هکتار	
	سیترا هیو		آبیاری	سیترا هیو : ۲۰ لیتر در هکتار	
	کافیک + سیلیکانتو + صابون محلولپاشی + بوفران		محلولپاشی	کافیک : ۲ لیتر در هکتار سیلیکانتو : ۲ لیتر در هکتار صابون محلولپاشی : ۱ لیتر در هزار لیتر آب بوفران : ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب	
	نیترا کلسیم سیترا		آبیاری	نیترا کلسیم سیترا : ۲۰ تا ۳۰ کیلو در هکتار	
زمان تغییر رنگ میوه	بورونیکا + صابون محلولپاشی + بوفران		محلولپاشی		
	کافیتو + صابون محلولپاشی + بوفران		محلولپاشی	فورتیکا : ۲ لیتر در هکتار صابون محلولپاشی : ۱ لیتر در هزار لیتر آب بوفران : ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب	دو تا سه هفته قبل از شروع برداشت
پس از شروع اولین برداشت	سیترا ۱۵-۵-۳۰		آبیاری	سیترا ۱۵-۵-۳۰ : ۲۰ تا ۳۰ کیلو در هکتار	
	سیترا ۱۵-۵-۳۰		آبیاری	سیترا ۱۵-۵-۳۰ : ۲۰ کیلو در هکتار	دو هفته پس از شروع برداشت
	کافیک + کافیتو + صابون محلولپاشی + بوفران		محلولپاشی	کافیک : ۲ لیتر در هکتار کافیتو : ۲ لیتر در هکتار صابون سیترا : ۱ لیتر در هزار لیتر آب بوفران : ۲۵۰ گرم در هزار لیتر آب	
	سیترا ۱۵-۵-۳۰		آبیاری	سیترا ۱۵-۵-۳۰ : ۲۰ کیلو در هکتار	یک ماه پس از شروع اولین برداشت

- ❖ اولویت اول کوددهی، موارد مشخص شده با رنگ سبز می باشد.
- ❖ جهت تحقق بهترین نتایج، از این جدول تحت نظر کارشناسان مربوطه استفاده نمایید.
- ❖ در صورت نیاز به اختلاط با سموم یا کودهای خارج از جدول، ابتدا در سطح محدود روی گیاه مورد نظر آزمایش نمایید.
- ❖ مقادیر توصیه شده عمومی است و میزان مصرف، بسته به سن گیاه، شرایط محیطی و آزمایشات خاک و برگ متغیر است.